

PROCESSO SELETIVO 005/2018 - DENTISTA

Nome do(a) Candidato(a)

--

Esta prova objetiva está assim constituída:

DISCIPLINAS	Nº DE QUESTÕES
Conhecimentos de Saúde Pública	10
Conhecimentos Específicos	15
Total de questões	25

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Confira devidamente o material (FOLHA DE RESPOSTA e PROVA); se houver falha, solicite a presença do fiscal.
- A FOLHA DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchida com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão.
- Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição da FOLHA DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 02 (duas) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 30 (trinta) minutos, contados do seu efetivo início.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala a PROVA e a FOLHA DE RESPOSTAS, devidamente preenchida e assinada.
- Os dois últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.

SAÚDE PÚBLICA

1) Como profissional de saúde, o cirurgião dentista desempenha um importante papel na consolidação do Sistema Único de Saúde. As normas vigentes de vigilância sanitária requerem a notificação compulsória de algumas doenças emergentes, como dengue, cólera e tuberculose. Esta notificação constitui um documento legal e tem, entre seus principais objetivos, o(s) de:

- A) Isolar os casos em hospitais, erradicar os comunicantes e eliminar as fontes de infecção
- B) Conhecer a incidência da doença e propor medidas de prevenção e controle
- C) Fornecer dados para o estudo de esperança de vida ao nascer e seguimento dos casos notificados
- D) Isolar o paciente em hospitais especializados e propor medidas de quarentena

2) O Controle Social do Sistema Único de Saúde é desenvolvido pelos conselhos nacionais, estaduais e municipais. Escolha a alternativa correta em relação à atribuição e composição dos conselhos:

- A) Fiscaliza o fundo de saúde da esfera respectiva de governo, possui caráter normativo, e 50% dos membros são representantes dos usuários
- B) Aprova a programação orçamentária da esfera respectiva de governo, possui caráter consultivo, e 25% dos seus membros são representantes dos profissionais de saúde
- C) Formula estratégias e controles para política da respectiva esfera de governo, possui caráter deliberativo, e 50% dos membros são representantes dos profissionais de saúde
- D) Fiscaliza o fundo de saúde da esfera respectiva de governo, possui caráter normativo, e 25% dos membros são representantes dos profissionais de saúde
- E) Atua na formulação de estratégia e controles para a política de saúde, possui caráter deliberativo, e 50% dos membros são representantes dos usuários

3) Considere as afirmativas a seguir:

- I. A saúde do trabalhador abrange a avaliação do impacto que as tecnologias provocam na saúde
- II. Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com o fim de adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- III. Vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, bem como da prestação de serviços de interesse de saúde.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e III
- B) III
- C) I, II e III
- D) II e III
- E) I e II

4) Nas alternativas a seguir, coloque V para verdadeiro e F para falso:

- () Os serviços públicos que integram o SUS constituem campo de prática de ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas em conjunto com o sistema educacional.
- () Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram o SUS mediante convênio, preservados sua autonomia administrativa e financeira, patrimônio, o ensino e a pesquisa e extensão, nos limites conferidos pelas instituições a que sejam vinculados.
- () Os serviços de saúde das forças armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) não podem integrar o SUS.
- () Nenhum servidor público da área de saúde pode acumular dois cargos ou empregos.

Marque a alternativa que contém a seqüência correta:

- A) V, V, V, V
- B) V, F, V, F
- C) V, V, F, F
- D) F, F, V, V
- E) F, F, F, F

5) As mudanças desejadas no setor de saúde não são conjurais nem compensatórias nas partes de medidas estruturais, que incluem a (o):

1. Consolidação de um sistema público nacional em que três esfera de governo funcionem de modo harmônico.
2. Sistema estimulador da qualificação com redução de gastos.
3. Adoção de modelos técnico-operacionais inovadores que visem à atenção integral, personalizada e de alcance coletivo.
4. Implantação e implementação de um sistema de acompanhamento, controle e avaliação que permita reduzir gastos supérfluos.

Das citadas mediadas estruturais, está(ão) correta(s) apenas:

- A) 1 e 3
- B) 2, 3 e 4
- C) 4
- D) 3 e 4
- E) Todas as alternativas estão corretas

6) O objetivo geral do PSF é o de contribuir para a reordenação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde(SUS). A seguir, estão listados os objetivos específicos do PSF, havendo apenas uma exceção:

- A) Estimular a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social
- B) Intervir nos fatores de risco aos quais a população esta exposta
- C) Reduzir a demanda de pacientes para as unidades de níveis secundário e terciário
- D) Prestar assistência integral, contínua, com resolutividade e boa qualidade à população
- E) Humanizar as praticas de saúde mediante o estabelecimento de um vinculo entre os membros da equipe e a população

7) O processo saúde-doença é medido pela análise da situação de saúde, que inclui as pesquisas do estado de saúde da população e os determinantes ou condições de vida na família ou em uma comunidade determinada. Tem por objetivo identificar problemas e necessidades de saúde mediante a utilização de variáveis- indicadores da realidade, comparando-os com os desejados ou planejados. Os indicadores podem ser diretos (de

causa-risco) e indiretos (consequência-efeitos). A seguir, estão listados os indicadores diretos, com uma única exceção:

- A) Modo de vida (habitação, trabalho, educação etc.)
- B) Estilo de vida (tabagismo, álcool, dieta rica em gordura e sal, obesidade etc.)
- C) Biológicos(idade, sexo, constituição e herança genética)
- D) Dinâmica da população (taxa de fecundidade, migração e mortalidade)
- E) Serviços de saúde (cobertura e qualidade da atenção)

8) São muitas as atribuições da equipe de saúde da família, daí ser exigida uma carga de trabalho e dedicação intensa por partes dos seus componentes. A melhor maneira de dar conta destas tarefas, árduas e contínuas, faz-se mediante:

- A) Utilização dos indicadores sociais e de saúde levantados pelo IBGE
- B) Realização de inquéritos epidemiológicos
- C) Resposta à demanda da comunidade
- D) Elaboração de um plano local para o enfrentamento dos determinantes do processo saúde-doença aos quais a população está exposta
- E) Observância das orientações estipuladas, para cada equipe, pelo coordenador do PSF do município

9) A estratégia de saúde da família desenvolve-se, sempre, buscando a aplicação de medidas preventivas na historia natural da doença, sendo o período ideal de atuação o da pré-patogênese (promoção da saúde e proteção específica). Considerando os três níveis de prevenção, estabeleça uma correlação com os diversos tipos de ação a serem desenvolvidos:

1. Prevenção primária.
2. Prevenção secundária.
3. Prevenção terciária.

() Incentivo ao aleitamento materno.

() Educação sexual

() Vacinação de bloqueio diante de um caso suspeito de sarampo.

() Incentivo para o auto-exame de mama.

() Controle de vetores

- A) 2, 2, 1, 1, 3
- B) 1, 1, 2, 2, 1
- C) 1, 2, 2, 2, 3
- D) 2, 1, 3, 3, 1
- E) 3, 1, 1, 2, 3

10) Cabe à equipe do PSF desenvolver ações de avaliação do estado de saúde da população adulta de sua área adstrita, sempre nos contextos familiar e social, identificando os fatores de risco para os agravos mais freqüentes, com vistas à sua eliminação ou minimização, bem como diagnosticando e tratando, de forma rápida, apropriada e resolutiva. Dos agravos listados a seguir e que têm alta prevalência em nosso país, assinale o que deve ser alvo de maior atenção dos membros da equipe:

- A) Hipertensão arterial
- B) Diabetes melito
- C) Tuberculose
- D) Doenças sexualmente transmissíveis/AIDS
- E) Todas as alternativas estão corretas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Paciente relata dor aguda, rápida, localizada e fugaz diante de estímulo em um dente com lesão cáriosa profunda. Histologicamente, tem-se vasos sanguíneos pulpares com vasodilatação prolongada, predispondo ao edema, acompanhado de um infiltrado leve a moderado de células inflamatórias. Os testes de percussão e palpação apresentam resultados negativos. Diante de tais características, pode-se classificar o quadro como:

- A) pulpíte reversível.
- B) pulpíte irreversível.
- C) pulpíte hiperplásica.
- D) necrose de liquefação.
- E) necrose gangrenosa.

12) Do ponto de vista estrutural, a polpa dentária é um tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado e innervado. Entre as principais células que o compõem, apresentam-se em maior número:

- A) os odontoblastos.
- B) os fibroblastos.
- C) as células ectomesenquimais.
- D) os macrófagos.
- E) os micrófagos.

13) Manobra semiotécnica feita a partir da pressão na mucosa próxima às lesões ativas que, quando positivo, promove a formação de uma bolha devido à fragilidade da camada epitelial em doenças vesicobolhosas. Trata-se do sinal:

- A) de Nikolsky.
- B) de Murph.
- C) de Tzank.
- D) de Zileri.
- E) de Braxton.

14) Paciente de 17 anos comparece ao consultório com queixa de crescimento gengival indolor na região anterior de maxila, com tempo de evolução de pelo menos 3 meses. Ao exame clínico apresenta massa nodular sésil, de aproximadamente 1 cm, com origem na papila interdental e coloração variando do vermelho ao rosa, com ulceração discreta em sua superfície. No exame de imagem não foram encontradas alterações patológicas significativas. Assinale a alternativa que descreve a hipótese diagnóstica do caso descrito.

- A) Fibroma ossificante periférico.
- B) Lipoma.
- C) Adenoma pleomórfico.
- D) Gengivite ulcerativa necrozante aguda.
- E) Neurofibroma.

15) A hiperplasia gengival associada a medicamentos se refere a um crescimento anormal dos tecidos gengivais, secundário ao uso de medicamentos sistêmicos. Assinale a alternativa que apresenta medicamentos que podem causar essa patologia.

- A) denosumabe, midazolam, vancomicina.
- B) claritromicina, lamotrigina, carvedilol.
- C) taxol, gabapentina, propanolol.
- D) ciclosporina, fenitoína, nifedipina.
- E) tetraciclina, sertralina, diazoxina.

16) Os medicamentos antirreabsortivos, como os bisfosfonatos, são utilizados amplamente no tratamento das desordens ósseas e da hipercalcemia, e podem promover alterações significativas na cavidade e estruturas bucais. Com relação a essas alterações, pode-se afirmar que:

- A) pacientes que fazem uso crônico de bisfosfonatos endovenosos são considerados saudáveis, sem a necessidade de cuidados especiais para realização dos procedimentos odontológicos.
- B) a osteorradinecrose é uma das complicações mais comuns nos pacientes que fazem uso crônico de bisfosfonatos.
- C) o tratamento da necrose óssea pode ser realizado por meio de irrigação, terapia medicamentosa com antibióticos e debridamento cirúrgico.
- D) bisfosfonatos aumentam a síntese óssea por ação direta sobre os osteócitos.

- E) próteses implanto suportadas são a primeira escolha para aqueles que fazem uso crônico de bisfosfonatos, por minimizar os traumatismos sobre os tecidos moles e conseqüentemente o risco de necrose óssea.

17) As manifestações bucais da infecção pelo HIV podem representar os primeiros sinais clínicos da doença, por vezes antecedendo as manifestações sistêmicas. Esse fato aponta para o importante papel do Cirurgião-dentista como profissional de saúde, que pode suspeitar dessas manifestações, diagnosticar e tratar essas alterações. Assinale a alternativa que apresenta apenas lesões bucais associadas com infecção pelo HIV.

- A) Verruga vulgar, condiloma acuminato, herpes simples.
- B) Psoríase, úlcera aftosa recorrente, HPV.
- C) Sialoadenite, hiperplasia epitelial, linfocitose.
- D) Varicela, Líquen plano, púrpura trombocitopênica.
- E) Candidíase, leucoplasia pilosa, eritema gengival linear.

18) Assinale a alternativa que descreve corretamente os níveis de prevenção em Odontologia, em especial da cárie dentária.

- A) O primeiro nível de prevenção consiste em diagnóstico precoce e tratamento imediato da doença.
- B) Os níveis de prevenção excluem os processos de reabilitação, uma vez que a doença já esteve presente.
- C) O segundo nível de proteção consiste na limitação dos danos, evitando que a doença evolua.
- D) A odontologia curativa ou restauradora é classificada como quinto nível de prevenção.
- E) Os níveis de prevenção compreendem as etapas em que se podem colocar obstáculos à evolução da doença.

19) O recurso técnico radiográfico que utiliza o princípio da paralaxe para a dissociação de canais radiculares sobrepostos é conhecido como Método de:

- A) Parma.
- B) Mataldi.
- C) Clark.
- D) Miller-Winter.

E) Donovan.

20) A respeito dos anestésicos locais de uso odontológico, é correto afirmar:

- A) São fármacos que bloqueiam irreversivelmente a condução nervosa com perda de sensações em área circunscrita do organismo, sem alteração do nível de consciência.
- B) Efeito colateral sistêmico possível é o desenvolvimento de metahemoglobinemia seguindo-se à administração de intravascular de prilocaína.
- C) Felipressina é vasoconstritor não simpaticomimético indicado principalmente para pacientes com angina, para pacientes que já sofreram infarto e gestantes.
- D) Epinefrina é vasoconstritor indicado para pacientes com hipertireoidismo e feocromocitoma.
- E) O metabolismo da maioria das amidas resulta na produção de ácido para-aminobenzoico, que pode ser associado a reações alérgicas, enquanto o dos ésteres raramente causa reações alérgicas.

21) Quanto aos cuidados pós-operatórios de cirurgias odontológicas no consultório, é correto afirmar:

- A) São orientações direcionadas à prevenção de hemorragias: a ingestão de alimentos sólidos, compressas quentes e o descanso com a cabeça elevada.
- B) Indica-se usar inicialmente uma alimentação mais leve e evitar por completo a higiene oral por cinco dias.
- C) É recomendado usar compressas de gelo na face após a cirurgia por facilitar a vasodilatação e, com isso, diminuir o edema e a dor.
- D) A higiene na área cirúrgica deve ser cuidadosa, mas jamais ausente, e a escovação dos dentes e da língua deve ser normal.
- E) É contraindicado o uso de produtos à base de clorexidina por dificultar o processo de cicatrização e organizar o coágulo.

22) Entre os fatores associados ao alto risco da cárie, é correto citar:

- A) alta renda média familiar.
- B) placa bacteriana em grande quantidade nos dentes 16,11,32 e 36.
- C) menor concentração populacional nos domicílios.
- D) maior grau de escolaridade da mãe.
- E) uso de água fluoretada.

23) Existem diferentes níveis de aplicação das medidas preventivas adequados aos períodos e fases da história natural da doença. O nível de aplicação que envolve uma ação individual sobre a prática de atos favoráveis à saúde pode ser classificado como:

- A) 1°.
- B) 2°.
- C) 3°.
- D) 4°.
- E) 5°.

24) É fator de risco para o aparecimento de doença periodontal:

- A) presença de cepas virulentas de *Streptococcus mutans* na cavidade oral.
- B) utilização de solução de bochecho com clorexidina, provocando alterações da mucosa devido às suas toxicidade e substantividade.
- C) paciente jovem com ausência ou má formação do ligamento periodontal.
- D) paciente com diabetes mellitus.
- E) uso prolongado do triclosan, por provocar a destruição dos desmossomos, levando a injúria periodontal.

25) Visando à restauração de uma cavidade classe II de Black para restauração com amálgama, o profissional deve preparar o ângulo cavo-superficial de forma adequada, sendo que esse ângulo é:

- A) obtido pela união de duas paredes internas da cavidade preparada.
- B) obtido pela união de três ou mais paredes internas da cavidade preparada.
- C) formado pela junção das paredes da cavidade preparada com a superfície externa do dente.
- D) formado pela junção de uma parede do assoalho e da cavidade preparada.
- E) formado pela junção do esmalte e da dentina nos preparos cavitários.

GABARITO

1. B	2. E	3. C	4. C	5. E
6. C	7. D	8. D	9. B	10. E
11. A	12. B	13. A	14. A	15. D
16. C	17. E	18. E	19. C	20. B
21. D	22. B	23. E	24. D	25. C

Assinatura

Nome:

Cpf: